

University of Groningen

Causes of coughing in a Groningen general practice

Löwenberg, Alfred

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1959

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Löwenberg, A. (1959). *Causes of coughing in a Groningen general practice*. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN

I

Recidiverend en chronisch hoesten dient een aanwijzing te zijn een onderzoek naar praedisponerende factoren — met name naar uitingen van een astmatische constitutie — in te stellen.

II

Bij moeheid als hoofdklacht moet aan astma, resp. emfyseem als oorzaak worden gedacht.

III

Ook bij een schijnbaar normale vitale capaciteit met een 1-seconde waarde $> 70\%$ moet bij het longfunctieonderzoek voor de astma-diagnostiek het effect van pharmaca op deze waarden onderzocht worden.

IV

Een herhaald sputumonderzoek op eosinophile leucocyten en een herhaald longfunctieonderzoek zijn soms nodig, om het bestaan van een astmatische toestand met behulp van deze onderzoekingsmethoden te steunen.

V

De grasvulling van beddegoed is een vrij frequent voorkomende oorzaak van chronische neusklachten (met of zonder hoesten) bij zuigelingen.

VI

Het verblijf op een kleuterschool kan op kinderen met neiging tot recidiverende luchtweginfecties een ongunstige invloed hebben.

VII

De indicatie tot tonsillectomie dient in het algemeen door de huisarts gesteld te worden.

VIII

Lies- en navelbreuken bij zuigelingen dienen in de eerste instantie — en wel vroeg en langdurig — conservatief te worden behandeld.

IX

Paraesthesiën van het mondslijmvlies zijn een aanwijzing om aan een diabetes mellitus te denken.

X

Polyarticulaire klachten bij normale leverfunctieproeven kunnen in het prae-icterische stadium van hepatitis infectiosa voorkomen.

XI

In Groningen dient bij patienten met maagdarmklachten faeces- en urineonderzoek op pathogene darmbacteriën stelselmatig te worden verricht, daar bacillaire dysenterie en salmonellosen in deze stad gedurende het gehele jaar vrij frequent voorkomen.

XII

Nacontrole van vrouwen, geopereerd aan prolapsus vaginae, verdient meer aandacht ter voorkoming en behandeling van postoperatief optredende dyspareunie.

XIII

Hulp en steun aan de patient en zijn omgeving in maatschappelijke problemen in de ruimste zin, zijn een belangrijke preventieve taak van de huisarts om een uitgesproken psychiatrisch lijden te voorkomen.